



pirgus WG

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλοαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιεργείες - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής):** ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγανότο, Νεραντζιά): Για Φυτόφθορα: Δόση 530-600 γρ./στρέμμα (300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 110-200 λίτρα/στρέμμα. Τρεις (3) ψεκαμοί: 1ος ψεκαμοί την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο), 2ος ψεκαμοί τον Ιούλιο-Αύγουστο και 3ος ψεκαμοί τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο (ΒΒCH 57-81). ΜΗΝΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κουδονιά, Μουσαμώλια, Αχλαδάκηλα): Δόση 300 γρ./στρέμμα (300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Για Φυτόφθορα λαμού και ριζών: Τρεις (3) ψεκαμοί: 1ος ψεκαμοί την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο), 2ος ψεκαμοί τον Ιούνιο-Ιούλιο και 3ος τον Οκτώβριο κατά το λήθαργο (ΒΒCH 91-77). Για Βακτηρίωση: Ψεκαμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο καρπών διαμέτρου 10 mm (στάδιο καρπιόλιου) (ΒΒCH 69-77). ΑΜΠΕΛΙ (ονοποποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./στρέμμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκαμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης (ΒΒCH 12-15). ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υ+Θ): Για Φυτόφθορα λαμού και ριζών: Δόση 250 γρ./στρέμμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικοί ψεκαμοί έως την άνθηση (ΒΒCH 12-59). Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση: Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκαμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (ΒΒCH 10). ΑΙΤΟΥΡΙ (Υ+Θ): Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκαμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (ΒΒCH 10). ΚΟΛΟΚΥΘΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ): Για Περονόσπορο: Δόση 160-300 γρ./στρέμμα (200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικοί ψεκαμοί φυλλώματος (ΒΒCH 14-99). ΠΕΠΟΝΙ/ΚΑΡΠΟΥΖΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ): Για Περονόσπορο: Δόση 160-300 γρ./στρέμμα (200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικοί ψεκαμοί φυλλώματος (ΒΒCH 14-99). ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ+Θ): Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκαμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (ΒΒCH 10). ΚΑΛΑΜΠΙΤΙΚΑ* (Υ+Θ): Για Φυτόφθορα: Προληπτικοί ψεκαμοί φυλλώματος: Δόση 100-120 γρ./στρέμμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 250-300 λίτρα/στρέμμα. Ριζοτόσημα: Δόση 100 γρ./στρέμμα (5-10 γρ./τετρ. μέτρο). Υ: Υπαίθρου, Θ: Θερμοκηπίου.

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 3/30 ημέρες, ΜΗΝΟΕΙΔΗ: 3/30 ημέρες (για Φυτόφθορα), 2/30 ημέρες (για Βακτηρίωση), ΑΜΠΕΛΙ: 3/10 ημέρες, ΦΡΑΟΥΛΙΑ: 1-3/8-10 ημέρες (προληπτικοί ψεκαμοί). Εφαρμογή για εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση, ΤΟΜΑΤΑ, ΑΙΤΟΥΡΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ: 4/10 ημέρες, ΚΟΛΟΚΥΘΙ / ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ: 1-3 | 8-10 ημέρες, ΠΕΠΟΝΙ / ΚΑΡΠΟΥΖΙ / ΚΟΛΟΚΥΘΑ: 1-2 | 8-10 ημέρες, ΚΑΛΑΜΠΙΤΙΚΑ: 1-3 | 30 ημέρες (προληπτικοί ψεκαμοί), 1-2 | 30 ημέρες (ριζοτόσημα). **Παρατηρήσεις:** Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προϊόντων. ***Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.** **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύνθη/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκυθάκι: 3 ημέρες | Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγανότο, Νεραντζιά), Φράουλα (ψεκαμοί φυλλώματος): 14 ημέρες | Μηλοειδή, Μαρούλι: 15 ημέρες | Λιμνέλι: 28 ημέρες | Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος), Καλλωπιστικά: ~

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 30 ημέρες.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.
Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Production Date
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ Batch No
ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ Net Weight | **100 g**

pirgus WG
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκαμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκαμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.



Fosetyl-AI (Φοσετύλ-αλ) 80%

pirgus WG

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: Fosetyl-AI : 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 17,53% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 60949/07.04.2020
Κάτοχος άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος: Industrial Química Key S.A., Avda. Cervera, s/n, 25300 Tàrraga, Lleida, SPAIN (Ισπανία). Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Θέση Ήροισπήλαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr

Διανομή: gemma since 1981 | Α. Θρακομακεδόνων 107, Αχαρνάι 13679, 2102434006 / gemma.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 100 g

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyl-5-decylne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσετε κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επικοινωνίας στην καλλιέργεια μετά τον ψεκαμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** **• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή ένα γιατρό. **• Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. **• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκευάσμα. **ΑΝΤΙΔΩΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΩΔ. 18.417

5 204246 012482