UFI: MWC2-30Y9-J00X-M5K5

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Switzerland / Κάτοχος της έγκρισης: Syngenta Hellas AEBE, Λ.Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττική / Υπεύθυνος κυκλοφορίας: στην Ελληνική αγορά: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr

**Διανομή:** gemma® Λ. θρακομακεδόνων 107, Αχαρναί 13679 / 2102434006 / gemma.gr

ΚΩΔ. 18.449

# strike 25 EC

## Μυκητοκτόνο
**με προστατευτική και θεραπευτική δράση**

**Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)**

Εγγυημένη σύνθεση: Difenoconazole 25% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 76.92% β/β

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αρ. Αδείας διάθεσης στην Αγορά: 61101/13.01.2023

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:**
**50 κ.εκ.**

gemma tech

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** •Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς •Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο •Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
**Δηλώσεις Προφύλαξης:** Μακριά από παιδιά, Φυλάσσεται κλειδωμένο, Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο, Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του, Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα, Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια ωφέλειαστη ζώνη: 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς και της κατσανάκης, 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού, 15 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (όψιμες εφαρμογές), 25 μέτρων για τις καλλιέργειες των πρίκοκών (πρώιμες εφαρμογές), της κερασιάς και της δαμασκηνιάς, 30 μέτρων για τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ροδακινιάς, 12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των ζαχαροτεύτλων, του πανιζαριού, των ξηρών φασολιών, της φακής, των ρεβιθιών και των λοιπίνων, 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του καλλιεθιού, του πεπονιού, του καρπουζιού, της τομάτας, της φράουλας, της πατάτας, της γλυκοπατάτας, του κριτμωλιού, του ακόρδου, του πράσου, του μαϊντανού, της αγκινάρας, του λάχανου, του κουνουπιδιού, του μπρόκολου, των λαχανικών βρυξελλών, του σελερι, των φυλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου και του σπαραγγιού, Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα σιμέουρα και τα βατάψιουρα.
**ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.. Μην προκαλείτε εμετό. Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσουν. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107795777**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος
**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση, Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.
**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρείς (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως οι αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.
**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας.** Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διαφάνεια της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Το σκεύασμα είναι συμβατό σε προγράμματα IPM.
**ΔΙΑΛΕΙΡΣΕΙΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία diffeconazole που ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. Το diffeconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομείωλώσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγραμμα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Μη μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το STRIKE 25EC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει το δραστικό συστατικό Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διελκυαστικά και έχει προληπτική δράση. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φράουλα, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι κ.α.
**Πεδίο Εφαρμογής –Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής- Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:**
**Μηλιά:** για Φουζικλάδιο δόση: 30 κ.εκ./στρ. (15-20 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 61-84 / 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά:** για Φουζικλάδιο δόση: 30 κ.εκ./στρ. (15-20 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 61-84 / 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Ροδακινιά, Βερικοκιά:** για Φαιά σήψη, Οίδιο, Εξωσκοπιά δόση: 45 κ.εκ./στρ. (20-30 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 60 μέχρι 7 ημέρες από τη συγκομιδή / 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Δαμασκηνιά, Κοραλιά:** για Φαιά σήψη, Οίδιο, Εξωσκοπιά δόση: 30 κ.εκ./στρ. (20 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 60-69 / 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Ελιά:** για Κλαδοκάνιο (ΟΙΕ: Πεσσαπτόμυ) δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50-60 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 75-85/ 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** για Οίδιο, Μαύρη σήψη δόση: 20 κ.εκ./στρ. (12-20 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 12-85/ 4 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φράουλα (Α):** για Οίδιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 51-89/ 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φράουλα (Θ):** για Οίδιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 51-89/ 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Σμέουρα,Βατάψιουρας:** για Οίδιο, Δρεπανοπυρήνα, Μαύρη σήψη, Σκωρίαση δόση: 40 κ.εκ./στρ. (30-40 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 31-49/ 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Τομάτα (Α+Θ):** για Αλτερναρίαση, Οίδιο, Κλαδοσπορίωση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 20-87/ 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Πιπόνι (Α+Θ), Καρπούζι (Α+Θ), Αγγούρι (Α+Θ), Κολοκύθι (Α+Θ):** για Οίδιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) Α: BBCH51-86 Θ: BBCH 21-89 / 3 εφαρμογές με 8 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αγκινάρα:** για Αλτερναρίαση, Έλκος, Μυκοσφαιρέλλα, Οίδιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-46 / 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Κουνουπίδι, Λάχανο:** για Αλτερναρίαση, Μυκοσφαιρέλλα δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-46 / 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μπρόκολο:** για Αλτερναρίαση, Οίδιο, Έλκος, Μυκοσφαιρέλλα δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-46 / 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μαϊντανός (Α):** για Σεπτόριο, Οίδιο, Αλτερναρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40 / 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μαϊντανός (Θ):** για Σεπτόριο, Οίδιο, Αλτερναρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40 / 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Σέλερι ( Α+Θ):** για Σεπτόριο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-49 / Α: 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα Θ: 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Κρεμμύδι, Σκόρδο:** για Αλτερναρίαση, Σκωρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-49 / 2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Πράσο:** για Αλτερναρίαση, Σκωρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-49 / 3 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. **Σπαράγγι:** για Σκωρίαση, Σεπιμόλιο δόση: 50 κ.εκ./στρ., BBCH 41-89 / 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Πατάτα, Γλυκοπατάτα:** για Αλτερναρίαση δόση: 60 κ.εκ./στρ., BBCH 40 -85 / 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Ζαχαροτεύτλα, Παντζάρι:** για Κερκοσπορίωση, Ραμουλάρια, Οίδιο, Σκωρίαση δόση: 40-50 κ.εκ./στρ., BBCH 31-49 / 3 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φακός (Σπιτί φασόλια) Φακές, Ρεβίθι, Λούπινα:** για Ασκοχύτωση, Μυκοσφαιρέλλα δόση: 40 κ.εκ./στρ., BBCH 51 -79 / 2 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ):** για Αλτερναρίαση, Οίδιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 20-87 / 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Λαχανάκια Βρυξέλλων:** για Αλτερναρίαση, Οίδιο, Έλκος, Μυκοσφαιρέλλα δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-47 / 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Καλλωπιστικά (Α/Θ):** Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Γλαδιόλα, Καλεντούλα, Ντάλιι, Βερόνικα, Μπιγκόνια, Πετονιάς, Αγγελική, Ευώνυμο, Αλθαία: για Αλτερναρίαση, Κηλιδοκορίωση, Ανθράκωση, Οίδιο, Σκωρίαση, Ραμουλάρια, Σεπτόρια, Σεπιμόλιο δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) BBCH 40-89 / 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φύλλα σέλινου** (Α) (ΧΗΣ), Φύλλα άνηθου (Α)(ΧΗΣ): για Σεπτόρια, Οίδιο, Αλτερναρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)/ 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φύλλα σέλινου** (Θ) (ΧΗΣ), Φύλλα άνηθου (Θ) (ΧΗΣ): για Σεπτόρια, Οίδιο, Αλτερναρίαση δόση: 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού) Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)/ 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Καστανιά** (ΧΗΣ): για Φαιά σήψη δόση: 45 κ.εκ./στρ., Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρι το 90% των καρπών να πάρουν το τελικό τους μέγεθος, (BBCH 69-79) / 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.
**Παρατηρήσεις: 1.** Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνήθως ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας). **2.** Στα καλλωπιστικά, συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκεύασματος. **3.** *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλυοσπόριο της ελιάς, για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απαιτούμενες πιο ισχυρές δόσεις.* **4.** *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα σε ζάλη φυλλοβόλων δενδρωδών καρπών.* **5.** *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες ανεπιπόθητες επιπτώσεις στη φύλλα σέλινου, τα φύλλα άνηθου και την κατσανάκι από τη χρήση του σκευάσματος, για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απαιτούμενες πιο ισχυρές δόσεις από τη χρήση του σκευάσματος.*
**Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κοραλιά 100-150, Ελιά: 80, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): 100, Φράουλα (Α), Φράουλα (Θ), Σμέουρα, Βατάψιουρα, Τομάτα (Α+Θ), Πιπόνι (Α+Θ), Καρπούζι (Α+Θ), Αγγούρι (Α+Θ), Κολοκύθι (Α+Θ), Αγκινάρα, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μπρόκολο,Μαϊντανός (Α), Μαϊντανός (Θ), Σέλερι ( Α+Θ), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο, Σπαράγγι, Πατάτα, Γλυκοπατάτα, Ζαχαροτεύτλα, Παντζάρι, Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ), Λαχανάκια Βρυξελλών, Καλλωπιστικά (Α/Θ)( Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Γλαδιόλα, Καλεντούλα, Ντάλια, Βερόνικα, Μπιγκόνια, Πετονιάν, Αγγελική, Ευώνυμο, Αλθαία),Φύλλα σέλινου(Α), Φύλλα άνηθου(Α), Φύλλα σέλινου(Θ), Φύλλα άνηθου(Θ): 50-100, Σπαρία (Σπιτί φασόλια) Φακές, Ρεβίθι, Λούπινα: 40-50, Καστανιά: 80-90
**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Φράουλα (Α+Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Α+Θ), Κολοκύθι (Α+Θ), Πιπόνι (Α+Θ), Καρπούζι (Α+Θ), Πατάτα, Γλυκοπατάτα, Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ): **3.** Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Σύσκορα, Βατάψιουρα, Τομάτα (Α), Βερικοκιά: Ή Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Αγκινάρα (Α), Μπρόκολο (Α), Κουνουπιδάκι (Α), Μαϊντανός (Α+Θ), Σέλερι (Α+Θ), Κρεμμύδι (Α), Σκόρδο (Α), Φύλλα σέλινου (Α+Θ), Φύλλα άνηθου (Α+Θ): **14.** Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο), Πράσο (Α), Λάχανο (Α), Ζαχαροτεύτλα, Παντζάρι, Λαχανάκια Βρυξέλλων: **21** Σπαρία (Σπιτί φασόλια), Φακές, Ρεβίθι, Λούπινα), Καστανιά: **28,** Ελιά: **30,** Σπαράγγι, Καλλωπιστικά – **Φυτοπαθολόγοι:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και ενκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.
**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας – σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν τις πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό.
**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.**