

[illegible]

66x38mm

[illegible]

Μην μολύνετε το νερό με το πρόβιο ή τη σκουριασά του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προσταφέσετε τους υδροβίους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας για τις εφαρμογές σε φυλλώδες καλλιέργειες και κηπευτικά, να σφίγγετε μίαν αψίδαζήζωνη προστασίας 10 μέτρων. Για τις εφαρμογές σε αιμηλά να σφίγγετε αψίδαζήζωνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αψίδαζήζωνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού, για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να

[illegible]

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται η συνδυασμός REVOLVER 1,0 EC με λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογενείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάφους καλλιέργειας θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.

[illegible][illegible][illegible]