phantom
2,5EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων

Deltamethrin
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,13% β/β
Περιέχει αρωματικό διαλύτη Νάφθα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

gemma® tech

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
10 κ.εκ.

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αριθ.Παρτίδας & Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 14456/12-7-2013

Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr
Διανομή: gemma® Λ. Θρακομακεδόνων 107, Αχαρναί 13679 / 2102434006 / gemma.gr

ΚΩΔ. 18.111

66x38mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή στην καλλιέργεια. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ** (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά, 20 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πρίν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Το σκεύασμα περιέχει deltamethrin, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνον όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Νερατζιά, Βαμβάκι, Σιτάρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα: 30 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Καρότο, Λάχανο, Φύλλα σέλινου, Πράσο, Μπιζέλι, Πατάτα, Καπνός: 7 ημέρες. Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Μαρούλι, Ρόκα, Αγγινάρα, Μανιτάρια: 3 ημέρες. Σπαράγγι, Φασόλι, Κουκιά, Ελαιοκράμβη, Σόγια: Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του. **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσιναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Νερατζιά): Αφίδες: Δόση 30-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου, Αλευρώδης: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά): Καρπόκαψα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα, Ανθονόμος, Μηλολόνθη, Κηκιδόμυγες, Θρίπες: Δόση 30-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Φυλλοδέτες: Δόση 35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψύλλα Αχλαδιάς: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Ψώρα Σαν Ζοσέ: Δόση 50-70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά): Φυλλοδέτες, Ανάρσια: Δόση 35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ραγολέτιδα ή μύγα κερασιού: Δόση 40-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μύγα Μεσογείου: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς: Δόση 30-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Ψώρα Σαν Ζοσέ: Δόση 50-70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **ΑΜΠΕΛΙ*:** Ευδεμίδα: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό (1η γενεά). 50-70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό (2η και 3η γενεά). Κογχυλίδα: Δόση 50-70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Τζιτζικάκια, Αφίδες, Πυραλίδα, Τσιγαρολόγος, Κοφτοσκούληκα: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΕΛΙΑ:** Δάκος: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται συμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Λεκάνιο, Θρίπες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Πυρηνοτρήτης: Δόση 30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό (ανθόβια), 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό (Καρπόβια). Εφαρμόζεται στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **ΦΡΑΟΥΛΑ:** Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ - ΠΡΑΣΟ - ΚΑΡΟΤΟ:** Αφίδες, Θρίπας, Αλευρώδης, Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΤΟΜΑΤΑ - ΠΙΠΕΡΙΑ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου) - ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βρωμούσες: Δόση 30 κ.εκ/100 λιτρα ψεκ. υγρό. Αλευρώδης: Δόση 70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό (θερμοκήπιο). Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ/στρ. (ύπαιθρος). Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βρωμούσες: Δόση 30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. (ύπαιθρος). Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΛΑΧΑΝΟ:** Πιερίδα, Μαμέστρα, Πλούζια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα, Αφίδες: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Πλουτέλλα: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ - ΡΟΚΑ:** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης. Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΟΣΠΡΙΑ (Φασόλι, Κουκιά):** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: Δόση 25-30 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθισης. **ΜΠΙΖΕΛΙ:** Αφίδα των μπιζελιών, Σιτόνα: Δόση 25 κ.εκ/στρ. Αφίδα των κουκιών, Κάμπιες, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.

ΑΓΓΙΝΑΡΑ: Κασσίδα: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Προντένια, Αφίδες: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Αφίδες, Θρίπας: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μετα τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:** Δίπτερα, Κολλέμβολα: Δόση 30-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Σποντόπτερα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι: Δόση 50-70 κ.εκ/στρ. Τζιτζικάκια: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Σποντόπτερα, Θρίπας, Λύγκος, Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΚΑΠΝΟΣ:** Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα, Επίτριξ: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Άλτης, Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Σκαθάρι, Κλεονός: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ**:** Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα: Δόση 30-50 κ.εκ/στρ. Διαβρώτικα: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΣΙΤΑΡΙ - ΚΡΙΘΑΡΙ:** Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα: Δόση 25-30 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΣΟΓΙΑ:** Άλτης, Κοφτοσκούληκα, ΝεΖάρα: Δόση 30 κ.εκ/στρ. Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθισης. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Άλτης, Meligetes spp., Αφίδες, Σκαθάρι: Δόση 30 κ.εκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθισης. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου, φυτώρια):** Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Μηλολόνθη, Κάμπια γαρυφάλου: Δόση 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Φυλλοδέτες. Δόση 35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Αλευρώδης: Δόση 70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Όγκος Ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιπφρουτ - Νεραντζιά - Μηλιά - Αχλαδιά - Αμπέλι - Μπιζέλι - Αγγινάρα - Σπαράγγι - Μανιτάρια: 100, Ελιά - Βερικοκιά - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Κερασιά - Δαμασκηνιά: 100-140 (Ψώρα Σαν Ζοσέ: 100), Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (Υπαίθρου) - Πιπεριά (Θερμοκηπίου) - Αγγούρι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 60-100 (Υπαίθρου) 60-140 (Θερμοκηπίου), Τομάτα - Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): 60-100 (Βρωμούσες: 60-140 θερμοκηπίου), Φύλλα Σέλινου - Ρόκα: 70, Φασόλι - Κουκιά - Πατάτα - Αραβόσιτος: 60, Φράουλα - Μαρούλι (Υπαίθρου) - Καπνός - Καλλωπιστικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου, Φυτώρια): 50-100 (Αλευρώδης: 70), Λάχανο - Σακχαρότευτλα: 50, Βαμβάκι: 30-50, Κρεμμύδι - Πράσο - Καρότο: 40-50, Σόγια - Ελαιοκράμβη: 40, Σιτάρι - Κριθάρι: 20-40. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιπφρουτ - Νερατζιά - Βερικοκιά - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Κερασιά - Δαμασκηνιά - Ελιά - Μανιτάρια - Ελαιοκράμβη - Ζακχαρότευτλα: 1. Μηλιά - Αχλαδιά: 2/14 (Ψώρα σαν Ζοσέ: 1). Αμπέλι - Φράουλα - Κρεμμύδι - Πράσο - Καρότο - Πατάτα: 3/14. Αγγούρι (Υ+Θ) - Μαρούλι (Υ) - Αγγινάρα - Καπνός - Καλλωπιστικά (Υ+Θ), Φυτώρια): 3/7. Λάχανο - Φύλλα Σέλινου - Ρόκα - Μπιζέλι - Φασόλι - Κουκιά - Βαμβάκι - Σόγια: 2/14. Τομάτα (Υ) - Πιπεριά (Υ) - Μελιτζάνα (Υ): 3/14. Πιπεριά (Θ): 4/7. Τομάτα (Θ) - Μελιτζάνα (Θ): 3/7. Σπαράγγι: 2/7. Αραβόσιτος: 3/7-14. Σιτάρι - Κριθάρι: 1-2/21. **Παρατηρήσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. **Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία