

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μοκρά από παιδιά, φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πιείτε ή καπνίσετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διότιση περιεχόμενου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΤΡΟ Ή ΑΡΧΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΦΥΛΗΣ. **Επιφάν με το μάτι:** Στεγνώνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Δεν μετά το πλύσιμο ο εφθόμενος επαφές. Αφύστε καθαρή συμβουλή). **Σε επαφή με το δέρμα:** Απομακρύνετε το θρεπόμενο ρούχο και παπούτσια. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φάλαγγ ή ψεκαστικό υγρού απομακρύνετε άμεσα τον πάθονα από την περιοχή έκθεσης. Διατηρείστε τον άσπαστο και αφήστε τον να ξεκουραστεί. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Κρατήστε καθαίστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΗΤΗΤΗΡΑΣΕΩΝ ή καλέστε ειδικούς γιατρό. Υπάρχει κίνδυνος πρόνυ να εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή την περίπτωση ο πάθον θα πρέπει να εισαχθεί αμέσως σε νοσοκομείο. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΠΕ ΕΜΕΤΟ. **Προστασία για τους παράγοντες πρώτες βοήθειες:** Χρησιμοποιείτε σπαστικά μέσα προστασίας. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συστηματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΤΗΡΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αδιάκοπη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα: 15 μέτρα σε πρώιμες εφθρονές σε μπλεϊθά, παρτιόκαρπα, ελιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, καρδιά, ροδά και ακτινίδια. Επιπλέον για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθησή/σαν οι μέλισσες είναι ενεργές/σαν υπάρχουν ανέμετα ζώα. Μην εισέρχεται στην ψεκασθεία περιοχή πριν οι αναποθείσει του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως. Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλομίσθας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι την μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Σμιμλρωρίστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Το ψεκαστικό μηχανήματα εφαρμόζονται πρέπει να ξεπλένονται με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επόμενη εφαρμογή.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείτε σπαστικά μέσα προστασίας. Να αποφεύγεται η παραοία προϊόντων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάθεσης κίνησης. Διαμορφώση σπινθήρων - Φλόγες/ στην άμεση γειτονιά τους περιγών χειρισμού του προϊόντος. Μην ανάψετε ή προσπαθείτε πάνω σε κίβωλο προϊόν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρη του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι άδειες περιέχει (φιάλες, δοχεία) θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή να υφίστανται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος χρησιμοποιούνται στο ψεκαστικό διάλυμα). Στη συνέχεια καταστρέφονται με τρόπωμα για την διασφάλιση ότι δεν θα επαναχρηματοποιηθούν για οποδήποτε σκοπό και συλλέγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεται στην ψεκασθεία περιοχή πριν το ψεκαστικό νερό στεγνώσει τελείως.

Τελειότητα επιβίωση πριν τη συγκομιδή: Μην εφαρμόζομαι.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται ο συνδυασμός με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Φυτοεικτικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιεργείες και σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις. Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε φυτά μη στόχους. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα τον περίοδο της ανθοφύσης. ή όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοεικτικότητας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το SCORPION EC παρασκευάζεται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ερμητικά κλειστά αποθηκευτικούς χώρους.

Αριθμός Παρτίδας & Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

scorpion

Paraffin oil

EC

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες

Υγρό για γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Paraffin oil 96,9% B/B,
CAS No 64742-46-7
Βοηθητικές ουσίες 3,1% B/B

ΦΥΛΑΣΣΑΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



BIO

Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 1831/2003 και 893/2008.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση κατάποσης και διαταραχές στις αναπνευστικές οδούς.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: **14.624/17.10.2017**

Παρασκευαστής σκευάσματος: TOTAL Huiles S.A.S, France.
Κάτοχος της άδειας - Προϊόντος και της διάθεσης στην αγορά - Εμπιστοσύνη σκευάσματος: ELIMPEL ABEE
Θέση: Σπυριτζιόβου, 19600 Μόναχας Αττικής, Τηλ.: 210 5355431.
Email: el@elimpel.gr, www.elimpel.gr

Διανομή: **gemma** since 1981
Α.Θρακομακεδόνων 107, Αχαρνάι 15679 / 2102434016 / gemma.gr

ΚΩΔ. 18.116

gemma tech

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 200 Κ.Ε.Κ.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Επί εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δράση με φυσικό τρόπο (χημική δράση) το οποίο προκαλεί ασθένια των εντόμων στόχων (ακαμίων, προνιμφών και ωών).

Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις - Χρόνος Εφαρμογής: **ΕΣΠΕΡΟΒΕΛΩΝ** (Κρητικοί, Λεμόνι, μετακίονα, ποικιλίες), **Φρούτα:** **Κόκκινη Φύσρα, Ψευδοκόκκινη, Ασάνιο, Λαση Φύσρα, Μοσχο Φύσρα, Άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχος, Ακαρεοκτόνο** Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (1000-2000 κ.ε.κ./στ.α.). Μπορεί να εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστάται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). Για **Alouathrix Piceorum** μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα. **ΜΗΛΟΒΗΛΗ** (Μήλι, Αχλάδι): **Ψάρα Σαν Ζαζέ, Παρλιτέρια, Βαυβακόδα, Μυτιλάροφ Φύσρα, Στάχα Φύσρα, Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Φύλλα, Αφίδες, Ψευδοκόκκος*, Φώρες*, Ματόμερα***. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (1000-2000 κ.ε.κ./στ.α.). Μπορεί να εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστάται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). **ΑΜΠΕΛΗ:** **Χειμερινή ού του Κόκκινου τετράνυχου, Κοκκοειδή**. Δόση: 1800 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (1000 κ.ε.κ./στ.α.). Εφαρμόζονται στα χυμώδη στάδια (90% (9-11) της καλλιεργίας. Συνιστάται για εφαρμογή: **ΕΛΙΑ***, **Ακέρια, Παρλιτέρια, Ασάνιο, Πολλίνα, Λαση Φύσρα, Μυτιλάροφ Φύσρα, Φώρες, Βαυβακόδα**. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.ε.κ./στ.α. ή μία με 2000 κ.ε.κ./στ.α.).

Εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστάται 1-2 εφαρμογές με μήν μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ***: **Ψάρα Σαν Ζαζέ, Βαυβακόδα ή Διότιση, Ασάνιο, Παρλιτέρια, Μυτιλάροφ Φύσρα, Κρητικοί, Φώρες, Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Παραμορφωτικό φύσρα, Κρητικοί, Φώρες, Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Παραμορφωτικό άκαρι, Ακέρια, Αφίδες, Φυλλοδέτες**. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.ε.κ./στ.α. ή μία με 2000 κ.ε.κ./στ.α.). Εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστάται 1-2 εφαρμογές με μήν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΣΕΙΤΑΝΙΑ***: **Κίτρινος τετράνυχος, Ασάνιο, Φώρες, Φύλλα, Κρητικοί**. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.ε.κ./στ.α. ή μία με 2000 κ.ε.κ./στ.α.). Εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστάται 1-2 εφαρμογές με μήν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΚΑΡΥΔΙΑ***: **Κόκκινος τετράνυχος, Κίτρινος τετράνυχος, Ψάρα, Ψάρα Σαν Ζαζέ, Ακέρια**. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.ε.κ./στ.α. ή μία με 2000 κ.ε.κ./στ.α.). Εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστάται 1-2 εφαρμογές με μήν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΡΟΔΙΑ***: **Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ακέρια, Κοκκοειδή, Ασάνιο, Κρητικοί**. Δόση: 1000-2000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.ε.κ./στ.α. ή μία με 2000 κ.ε.κ./στ.α.). Εφαρμόζονται με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστάται 1-2 εφαρμογές με μήν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ***: **Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ψάρα Σαν Ζαζέ, Βαυβακόδα ή Διότιση, Κρητικοί**. Δόση: 1000 κ.ε.κ./100 λίτρα φέκ. υγρού (500 κ.ε.κ./στ.α.). Μία εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

ΠΑΡΛΙΤΕΡΙΑ: Μία μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν μετά την εφαρμογή βέβαι η θερμοκρασία 10°C υποκατά και είναι στα κρύα αλλά να μην προλαβαίνει η έλευση εφαρμογών καρπών. Η έλευση δέντρονεύσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργείες ελιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, καρδιά, ροδά και ακτινίδια καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εφθονών έντομων σκουμπίες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απειρίες που προκύπτουν από την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: Για τριπλή 60 λίτρα/στρέμμα, για ακτινίδια 50 λίτρα/στρέμμα, για τις υπόλοιπες καλλιεργείες 40-50 λίτρα/στρέμμα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτολογικής ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολυκιστεί: Π.χ. διαχειριστή ανθεκτικότητας. **Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.α.π.** Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. Να μη γίνεται εφαρμογή σε άδεια ή ενοχλημένα Νηοα αποβλήτων, έρποντας, έρπον ανώμαλη ή που έχουν υποστεί υψηλή αεραγωγή Αίθραση.

