

114x170mm

control

GR

Πυρεθρινοειδές
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και δια στομάχου
με προληπτική & κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο
μυζητικών και μασητικών εντόμων
σε διάφορες καλλιέργειες.

lambda-cyhalothrin (λάμδα-σιαλοθρίν)

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη Σύνθεση:
lambda-cyhalothrin 0.4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 99.59 % β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14768/05.02.2021

Κάτοχος της άδειας:

SIPCAM OXON S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italia

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:


SIPCAM ΕΛΛΑΣ Mon. ΕΠΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί,

Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

Συσκευασία: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής,

Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr

Διανομή:  gemma® Α. Θρακομακεδόνων 107, Αχαρνάι 13679
since 1981 2102434006 / gemma.gr



 gemma®
tech

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
250 g

114x170mm

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. * Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Να εφαρμόζεται μόνο με τρακτέρ*.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχτε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμεινουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Εάν τα συμπτώματα επιμεινουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Επικινδύνου για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνος μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Περιέχει νάφθα (αρωματικός διαλύτης πετρελαίου).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC.

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη καταναμή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.

- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών / στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος δράσης: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μινυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Απευθείας εφαρμογή στο έδαφος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ, ΚΕΧΡΙ: α) Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο),

Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο: 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

β) **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.2-1.5 Χλμ/στρ. Στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΚΑΡΟΤΟ, ΖΑΧΑΡΟΤΥΤΛΟ, ΣΠΟΡΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, ΣΠΟΡΙ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ, ΣΟΓΙΑ: Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο), Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο, Προνύμφες Διαβρώτικα:

1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς. **ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΑΛΑΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:** Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο), **Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο, Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΠΑΤΑΤΑ: Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο), **Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο, Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. α) Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης. β) Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα/παράχωμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Μαρούλια, Ρόκα, Λυκοτριβόλο, Σκαρόλες/Αντίδια, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), ΣΠΑΝΑΚΙ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (Σπανάκι, Ανδράκιλα, Ξέσοουλα/Φύλλα τεύτλων (Υ), ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ (Μηλόκολλα, Κουνοπιτόια), ΚΕΦΑΛΟΠΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Αλαχανάκια Βρυξελλών, Λάχανα): Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο), **Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο, Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά την μεταφύτευση στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΔΕΜΑΡΑ: Αγρότιδες (Καραφατιμέ, Κοφτοσκοούληκο), **Μηλολόνη, Σιδηροσκούληκο, Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης.

Από τις ανωτέρω στις ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή: Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί, Γλυκό Καλαμποκό: 2 εφαρμογές ανά 45 ημέρες. Πατάτα: 2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες. Λοιπές καλλιέργειες: 1 εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: μη εφαρμοσμένο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακιάδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με οξύση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό υλικό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνδυαστικότητα: --

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (Net Weight): 250 g

ΚΩΔ. 18.420



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Production Date
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ Batch No
ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.