

CMYK



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Υγρό και αισθη εύφλε-
κτα • Μπορεί να προκα-
λέσει θάνατο σε περίπτωση
κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς • Προκαλεί
σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Γαλλικά να προκαλέσει υπηλιγία ή ζάλη • Πολύ τοξικό
για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις



UFI:
ENIKW-F8WV-1005-JPB3

phantom

2,5EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επικής - στομάχου κατά μυζητικών
και μασητικών εντόμων



Deltamethrin (Ντελταμεθρίν)
Γαλακτωματοποιημένο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση
Deltamethrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,53% β/β
Περιέχει ορμωτικό διαλυτή Νάτριο

ΦΥΛΑΙΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

gemma
tech

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 14456/12-7-2013

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Θέση Ξηροπήγασο, 19600 Μάνδρα Αττικής,
Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr

Διανομή:

gemma
since 1981

Λ. Θρακομακεδόνων 107,
Αχαρνά 13679 / 2102434006 / gemma.gr

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμός Παρτίδας & Ημερ. Παρασκευής:
Βλέπε επί της συσκευασίας

ΚΩΔ. 18.112

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

100 Κ.ΕΚ.

ΧΑΡΑΞΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗ ΚΟΛΛΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά, μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμά επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνεύσετε ανεμόπνοια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικό γάντι / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ειδική προστατευτική ενδυμασία κατά την κατά την ανάμειξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή στην καλλιέργεια. Φοράτε μακρύ μανίκι και μακριά παντελόνι κατά την επανεπίστροφο στην καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου / περίεκτη σύμβαση με την εθνική υγειονομική. **ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήσετε ειδική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχόμενο του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ / ΙΑΤΡΟ ΑΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΠΝΟΙΑ.** **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:** Μεταφέρετε τον πακέτο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διασφαλίζει την αντανά. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:** Εάν ζητήσετε ειδική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχόμενο του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή ένα γιατρό. **ΜΗΝ** προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φοβικοί επαφές, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο, ξεπλύνετε να ξεπλύνετε, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή ένα γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρο Διηλητηρίασης: (210) 7793777**
Μην ρυπαίνετε τα νερά υδρεύσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψάστια ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δένδρικές καλλιέργειες και την ελιά, 20 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μία αψάστια ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. Επιπλέον για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκατικό υγρό από τα φύλλα. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκατικό υγρό από τα φύλλα.

ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απαιτούμενες απαιτήσεις για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνον όταν είναι απαραίτητες με βάση τα πιθανά μείγματα όρα αναμονής (ημέρας). Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκατικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εντόμων στην εχθρο-στόχους με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλέκας, ειδικό σύστημα μικροσκοπικής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστηματικές καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελλειψικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΑΤΑ:** Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιφρουτ, Νεράζι, Βαμβάκι, Σιτάρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος, Ζαχαροτεύτλη 30 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Καρότο, Φύλλα σκόνης, Πρόσπο, Μπιζέλι, Πατάτα, Καπνός, Μαρούλι (Υ: 7 ημέρες, Φρούλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Ρόκα, Μανταρινιά 3 ημέρες, Σπαράγγι, Φασόλι, Κουκιά, Ελακωκωμύρι, Καλαμίνια από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος, Καλλυμινια (Υ+Φ) Μη Εφαρμογής. **ΔΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚΟΜΑΤΑ:** Οι κενές φύλλες σκευάσματος ξεπλένονται από πίστη με κρύο έστρωμα ή γίνεται υψηλό έστρωμα (τα νερά του έστρωματος τα ρίχνουμε στο ψεκατικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστρέφονται προηγούμενες με τσίμπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εντοπιστούν όλα τα σημεία συλλογής για αναγκαία κίνηση ή αναστροφή ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείστε το στο αρχικό, απαράβατο σκεύασμα του, σε μέρος ξηρό, άσπρο και καλά αεραζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαλυτικές των ντόντων. Να στις προαναφερθείς μειώνοντας των νευρικών κυττάρων. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκατικός φυλλομαστός. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκατικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναλόγως. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΚΑΛΩΡΤΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** ΕΠΙΣΤΟΛΙΑΣ (Πορτοκαλιά, Γκρέιφρουτ, Νεράζι):

5mm
ΣΚΟΤΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ
ΔΕΝ ΤΥΠΩΝΕΙ

Αφίδες: Δόση 30-50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Ακάνθια, Μύγα μεσογειακή, Αλετριώδης:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΕΠΙΣΤΟΛΙΑΣ** (Μανταρινιά, Λεμονιά): **Αφίδες:** Δόση 30 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΜΗΛΙΔΕΛΙΑ** (Μηλιά, Αχλαδιά): **Καρποκάφη μπιλάς, Αφίδες, Φύλλα, Ανθογόνος, Μηλολόνη, Κηρύδωμος, Θρίπες:** Δόση 30-50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Φυλλοδέστες:** Δόση 35 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Φύλλα Αχλαδιάς:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ψωρα Σαν Ζωές:** Δόση 50-70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ** (Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά): **Φυλλοδέστες, Ανάσας:** Δόση 35 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Ρυγολέπια ή μύγα κερασοειδής:** Δόση 40-50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Μύγα Μεσογειακή:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Αφίδες, Καρποκάφη δαμασκηνιάς:** Δόση 30-50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ψωρα Σαν Ζωές:** Δόση 50-70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται το καλοκαίρι κατά κεντρικών μορφών. **ΑΜΠΕΛΙ:** **Ευδελμιάς:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (ή γενικά), 50-70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (ή γενικά), **Κογυλιάς:** Δόση 30-70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **ΤΖΙΖΑΚΙΑ, Αφίδες, Πορτοκιά, Πυρηνολόνη, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΕΛΙΑ:** **Δάκος:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμών στις τενόντες. **Ακάνθια, Θρίπες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Πυρηνολόνη:** Δόση 30 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (ανάδρα), 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (ανάδρα). Εφαρμόζεται στην ένωση της άνθησης (ανάδρα γενικά) και αμέσως μετά την καρποποίηση (καρποποίηση γενικά) μεταξύ αυτών και εκκλίσης των νώνων να σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμών στις θερμοκρασίες παλιές. **ΦΡΑΓΟΥΛΑ:** **Αφίδες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ - ΠΡΑΔΟ - ΚΑΡΟΤΟ:** **Αφίδες, Θρίπες, Αλετριώδης, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ) - ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ) - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ) - ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ):** **Πρόσπο σκουλήκι, Σποντοπτερά, Δορυφόρος, Αφίδες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Αλετριώδης:** Δόση 70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (θερμοκρασία). **Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανειληφώς ανάλογα με την ένωση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Θ) - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ):** **Πρόσπο σκουλήκι, Σποντοπτερά, Δορυφόρος, Αφίδες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Βρωμοσός:** Δόση 30 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΑΙΤΟΥΡΙ (Υ+Θ):** **Πρόσπο σκουλήκι, Σποντοπτερά, Αφίδες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ):** **Πρόσπο σκουλήκι, Σποντοπτερά, Αίτης, Αφίδες:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ - ΡΟΚΑ:** **Αφίδες, Σποντοπτερά, Μοιστέρα, Αίτης:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΟΣΠΙΡΑ (Φασόλια, Κουκιά):** **Πρόσπο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 25-30 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης (80% 00-50). **ΜΗΛΙΔΕΛΙΑ** **Αφίδα των μπιζελιών, Ιστίνα:** Δόση 25 κεκ/στρ. **Αφίδα των κουνιών, Κίρπες, Θρίπες, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΕΠΙΣΤΟΛΙΑΣ:** **Αφίδες, Θρίπες:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μετά τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ:** Δόση 50 κεκ/στρ. **Κογυλιάς:** Δόση 30-50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΠΑΤΑΤΑ:** **Δορυφόρος:** Δόση 50 κεκ/στρ. **Σποντοπτερά:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** **Ρόκας σκουλήκι, Πρόσπο σκουλήκι:** Δόση 50-70 κεκ/στρ. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ:** Δόση 50 κεκ/στρ. **Σποντοπτερά, Θρίπες, Αίτης, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΚΑΙΝΟΣ:** **Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοκοκκίλας, Επίπες:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** **Αίτης, Κοφτοκοκκίλας:** Δόση 30-50 κεκ/στρ. **Σαβήρος, Κλεονός:** Δόση 50 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανειληφώς ανάλογα με την ένωση της προσβολής. **ΕΛΙΟΚΡΑΜΒΗ:** **Αίτης, Μελιζήτης sp., Αφίδες, Σκαθός:** Δόση 30 κεκ/στρ. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης. **ΚΑΛΑΜΠΕΤΙΚΑ (Υ+Θ, Φυτάρια):** **Αφίδες, Θρίπες, Αλετριώδης, Μηλολόνη, Κάμπα γαρυφαλλίου:** Δόση 50 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Φυλλοδέστες:** Δόση 35 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Αλετριώδης:** Δόση 70 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόζεται με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος Ψεκατικού υγρού (Αίτης/στρέμμα):** Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιφρουτ - Νεράζι - Μηλιά - Αχλαδιά - Αμπέλι - Μπιζέλι - Σπαράγγι - Μανταρινιά - Ρόκα - Ελιά - Βερκοκιά - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Κερασιά - Δαμασκηνιά - 100-140 (Ψωρα Σαν Ζωές 100), Τομάτα (Υ) - Πιπεριά (Υ) - Μελιτζάνα (Υ) - Αγγούρι (Υ) - 60-100, Πιπεριά (Θ) - Αγγούρι (Θ) - 60-140, Τομάτα (Θ) - Μελιτζάνα (Θ) - 60-100 & 60-140 για Βρωμοσός. Φύλλα Σελίνου - Ρόκα - 70, Φασόλι - Κουκιά - Πατάτα - Αραβόσιτος 60, Φρούλα - Μαρούλι (Υ) - Καπνός 50-100, Καλλυμινια (Υ+Φ) Φυτάρια 80 για Αλετριώδης, Ζαχαροτεύτλη 50, Βαμβάκι 30-40, Κρεμμύδι - Πρόσπο - Καρότο 40-50, Ελακωκωμύρι 40, Σιτάρι - Κριθάρι 20-40. **Μήγανος αρθρικός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιφρουτ - Νεράζι - Βερκοκιά - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Κερασιά - Δαμασκηνιά - Ελιά - Μανταρινιά - Ελακωκωμύρι - Ζαχαροτεύτλη - Μηλιά - Αχλαδιά 214 (Ψωρα Σαν Ζωές 1), Αμπέλι - Φρούλα - Κρεμμύδι - Πρόσπο - Καρότο - Πατάτα 314, Αγγούρι (Υ+Θ) - Καπνός, Καλλυμινια (Υ+Φ), Φυτάρια 317, Μαρούλι - Σελίνου - Ρόκα - Μπιζέλι - Φασόλι - Κουκιά - Βαμβάκι 214, Τομάτα (Υ) - Πιπεριά (Υ) - Μελιτζάνα (Υ) 314, Πιπεριά (Θ) 47, Τομάτα (Θ) - Μελιτζάνα (Θ) 37, Σπαράγγι 217, Αραβόσιτος 314, Σιτάρι - Κριθάρι 327. **Παρατηρήσεις:** **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκατάληψη αμπελοφύλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. *Η εφαρμογή του προϊόντος στον αρθρόποδο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτόξινων, ως αποτέλεσμα επιταχυσμένης αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia nra*, και *Sesamia nra*.

5mm
ΣΚΟΤΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ
ΔΕΝ ΤΥΠΩΝΕΙ

ΒΕΡΝΙΚΗ ΣΚΟΤΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ