shooter
200 SL

Διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου

Flupyradifurone
Πυκνό διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση: Flupyradifurone 20% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 82,19% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

gemma tech

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
50 κ.εκ.

UFI: 6JG0-S0PW-200K-JPJ2

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μύες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το SHOOTER 200SL κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ' αριθ. πρωτ.: 12629/326899/23.11.2020 άδειας του Υ.Α.Α.Τ.

Παρασκευαστής σκευάσματος: BAYER S.A.S. Γαλλία / Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431, Email: ellagret@ellagret.gr, www.ellagret.gr

Διανομή: gemma® Λ. Θρακομακεδόνων 107, Αχαρναί 13679 / 2102434006 / gemma.gr

18.428

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασία για πρόσωπο και μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. Σε περίπτωση εντατικής επαφής με το φύλλωμα της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο, φοράτε αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αποστραγγιζόμενα εδάφη. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: - φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων για την καλλιέργεια τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ), μελιτζάνας (Υ), αγγουριού (Υ), κολοκυθιού (Υ), κολοκύθας (Υ), καρπουζιού (Υ) και καπνού - φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού - φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς - φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων για την καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ) - φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες ελιάς, ξηρού μπιζελιού, μπιζελιού με ή χωρίς λοβό, φασολιού (χλωρό και όσπριο), κουκιού (χλωρό και όσπριο) και καρότου - αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβακιού - φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς. Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε: - μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη 5 μέτρων για τις καλλιέργειες αμπέλι, τομάτα (Υ), πιπεριά (Υ), μελιτζάνα (Υ), αγγούρι (Υ), κολοκύθι (Υ), κολοκύθα (Υ) και καρπούζι (Υ) ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50% - μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% για την καλλιέργεια της ελιάς - μία αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς - μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία:** Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας μπορεί να γίνει πλύση στομάχου μόνο εντός των δύο (2) πρώτων ωρών από την κατάποση. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων (Αφίδες, Αλευρώδεις, Τζιτζικάκια, Οπλοκάμπη, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκο Κοκκοειδή) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το flupyradifurone είναι ένα νέο εντομοκτόνο που ανήκει στη νέα χημική ομάδα butenolides (IRAC Group 4D). Έχει διασυστηματική ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου και ταυτόχρονα κινείται γρήγορα διελασματικά στο φύλλωμα. Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knock-down effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα, με αποτέλεσμα να συμβάλει στην πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης των ιώσεων ιδιαίτερα από τους αλευρώδεις. Το SHOOTER 200 SL έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία). Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην έκπλυση από βροχή (μετά από 2 ώρες βροχόπτωσης).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Στην καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ) να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με τεχνητή στράγγιση. - Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης κατά την περίοδο της άνθησης όταν οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη. - Μη χρησιμοποιείτε ως ζωοτροφή χοίρων τα καρότα, τα ξερά φασόλια, τα ξερά κουκιά και τα υποπροϊόντα των εσπεριδοειδών που προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:** - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** ---. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Πιθανώς να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού. Δεν είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Πορτοκαλιά-Νεραντζιά, Γκρέιπφρουτ-Φράπα: 30 ημέρες. Βαμβάκι, Καρότο: 21 ημέρες. Αμπέλι (επιτραπέζιο - οινοποιήσιμο), Ελιά (επιτραπέζια - ελαιοποιήσιμη): 14 ημέρες. Μπιζέλι με λοβό (Υ), Μπιζέλι χωρίς λοβό (Υ), Μπιζέλι ξηρό (Υ) : 7 ημέρες / 1 εφαρμογή κάθε χρόνο. Μπιζέλι με λοβό (Υ), Μπιζέλι χωρίς λοβό (Υ), Μπιζέλι ξηρό (Υ): Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής (BBCH 12-19) /1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια. Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ), Όσπρια Φασόλι-Κουκί:7 ημέρες / 1 εφαρμογή κάθε χρόνο. Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ): 3 ημέρες / 1 εφαρμογή κάθε χρόνο. Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ), Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ), Όσπρια Φασόλι-Κουκί: Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής / 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια. Τομάτα (Υ/Θ), Πιπεριά (Υ/Θ), Μελιτζάνα (Υ/Θ), Αγγούρι (Υ/Θ), Κολοκύθι (Υ/Θ), Κολοκύθα (Υ/Θ), Καρπούζι (Υ/Θ), Μαρούλι (Υ), Φράουλα (Θ), Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ), Μαύρο Βατόμουρο (Θ): 3 ημέρες. Καπνός, Καλλωπιστικά (Θ): Μη εφαρμόσιμο. Μηλιά, Αχλαδιά: Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):** Δάκος, Λεκάνιο, ΧΗΣ Κηκιδόμυγα* Βαμβακάδα* Μυτιλόμορφη ψώρα* Δόση 75 κ.εκ./στρ., όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της πλήρους έκπτυξης των ανθοταξιών μέχρι πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών (το χρώμα των καρπών έχει σχεδόν αλλάξει) (BBCH 55-85). Ειδικά για τον δάκο, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού. Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή τον χρόνο. **Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ, Φράπα, Νεραντζιά:** Αφίδες, ΧΗΣ στην Πορτοκαλιά:Κοκκοειδή - Ψύλλα των εσπεριδοειδών - Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης* Δόση 75 κ.εκ./στρ., όγκος ψεκ. υγρού 120-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης 50% του τελικού μεγέθους των καρπών, BBCH 69-75. Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Αμπέλι:** Τζιτζικάκια Δόση: 20 κ.εκ./στρ. για ύψος κόμης 80 εκ., 25 κ.εκ. /στρ.για ύψος κόμης 100 εκ., 30 κ.εκ./στρ. για ύψος κόμης 120 εκ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Κοκκοειδή, Metcalfa Pruinosa, Αφίδες, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκος, ΧΗΣ Θρίπας*: Δόση: 50 κ.εκ./στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Σολανώδη Υπαίθρου (Υ), Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα:** Αφίδες. Δόση: 45 κ.εκ./στρ., όγκος ψεκ. υγρού 45-100 λίτρα/στρ Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου (Υ), Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα:** Αφίδες. Δόση: 56 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 45-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Μαρούλι (Υ):** Αφίδες. Δόση: 62,5κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49. Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ), Μπιζέλια ξηρά (Υ):** Αφίδες. Δόση: 37,5κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρ Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό των 9 πρώτων φύλλων και ελίκων. (BBCH 12-19)- Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια & Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87)- Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή τον χρόνο. **Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ), Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ), ΟΣΠΡΙΑ, Φασόλι (Υ), Κουκί (Υ):** Αφίδες. Δόση: 37,5κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 20-75 λίτρα/στρ Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών. BBCH 69-75 - Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή τον χρόνο & Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής προβολής κατά το στάδιο ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών.BBCH 21-29 - Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια. **Καπνός:** Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τα συγκομίσιμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Βαμβάκι:** Αφίδες, ΧΗΣ Τζιτζικάκια*. Δόση: 37,5 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/στρ Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την έναρξη αποξήρανσης του φυλλώματος (BBCH 12-90). -Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1 εφαρμογή τον χρόνο. **Καλλωπιστικά, Βολβώδη:** Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/Ζεύγος φύλλων (από BBCH 11). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 4/7 ημέρες. **Καλλωπιστικά (θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων:** Αφίδες, δόση: 50 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ & Αλευρώδεις, δόση: 75 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/Ζεύγος φύλλων (από BBCH 11). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 4/7 ημέρες. **Κολοκυνθοειδή (θ): Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα & Σολανώδη (θ): Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα:** Αφίδες (Myzus persicae, Macrosiphum Euphorbiae) δόση: 45 κ.εκ. /στρ./ύψος φυτού 100 εκ., όγκος ψεκ. υγρού 75 λίτρα/στρ/100εκ. ύψους φυτού & Αφίδες (Aphis gossypii), Αλευρώδεις, δόση: 56 κ.εκ. /στρ./ύψος φυτού 100 εκ., όγκος ψεκ. υγρού 75 λίτρα/στρ/100εκ. ύψους φυτού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ. Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 2/10 ημέρες. **Φράουλα (θ):** Αφίδες, δόση: 50 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρ & Αλευρώδεις, δόση: 62,5 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 2/10 ημέρες. **Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (θ) (Raspberry), Μαύρο Βατόμουρο (θ):** Αφίδες δόση: 50 κ.εκ. /στρ./ύψος κόμης 100 εκ., όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρ & 100 κ.εκ. /στρ./ύψος κόμης 200 εκ., όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ. Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 2/10 ημέρες. **Καρότο:** ΧΗΣ Ψύλλα του καρότου, δόση: 37,5 κ.εκ. /στρ., όγκος ψεκ. υγρού 30-80 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής το στάδιο του 9ου πραγματικού φύλλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εδώδιμου μέρους του φυτού (BBCH 19-49). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1. **Μηλιά* Αχλαδιά*:** ΧΗΣ Ανθονόμος, δόση: 12,5 κ.εκ. /στρ για ύψος κόμης 100εκ., 25 κ.εκ. /στρ για ύψος κόμης 200εκ, 37,5 κ.εκ. /στρ για ύψος κόμης 300εκ, όγκος ψεκ. υγρού 30-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 54-65). Μεγ. αριθ. Εφαρμογών 1.

Παρατηρήσεις: - Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. - Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στα τζιτζικάκια στο βαμβάκι, τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη στην πορτοκαλιά, την κηκιδόμυγα, τη βαμβακάδα και τη μυτιλόμορφη ψώρα στην ελιά, τον θρίπα στο αμπέλι και στις καλλιέργειες της μηλιά και της αχλαδιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.