

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Πυκνό εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Spinosad: 2.4 κ.κ./βόλ
Βοηθ. ουσίες: 97.2 κ.κ./βόλ

Δισυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση

«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, χωρίς κάθε φορά εξαίρεση».

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΡΙΣΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΜΕΥΣΕΣ

A.A.-Δ.Α.: 14858/ΕΡ-29,01,2024

Κάτοχος της Δόσης: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Υόρως 2 και Α, Κηφισός 280, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι,

Αθήνα, Τηλ.: +302106889700

Υπεύθυνος για την τεχνική διάθεση στην αγορά:

GEMMA Ε.Α.Ε., Α. Ορακομακίδων 107 Περαχώρα,

Τ.Κ. 13679, Αχαΐας, Τηλ.: +302102434006 **100 κ.εκ./ε**

Εμπορικό σήμα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Διάθεση του περιεχομένου περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην αδειάζετε τη συσκευασία και το νερό του ελιψώματος του ακροαρίου στο νερό στην ύδρευση, ή σε οποιαδήποτε άλλο σημείο ροής νερού. Φοράτε γάντια κατά τη χρήση.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΜΙΑ: Σε περίπτωση αναγωγής ή αν ασυνήθιστη οδός είναι ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως το καλυμμένο προϊόν από τη χρήση.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΜΙΑ: Σε περίπτωση αναγωγής ή αν ασυνήθιστη οδός είναι ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως το καλυμμένο προϊόν από τη χρήση.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΜΙΑ: Σε περίπτωση αναγωγής ή αν ασυνήθιστη οδός είναι ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως το καλυμμένο προϊόν από τη χρήση.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΜΙΑ: Σε περίπτωση αναγωγής ή αν ασυνήθιστη οδός είναι ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως το καλυμμένο προϊόν από τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το spinosad είναι δισυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση φυλλοφάγων καυτών.

Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντομών διασπώντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενervation λόγω εξάντλησης της ποσότητας του εντόμου παροχής λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η αποτελεσματικότητα είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντομών επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΙΣΤΟ ΣΦΑΛΕΣ

Μηνύα παρασκευάζει / Αρ. πιστοποίησης

Βλέπε από μέρος της φιάλης

Κωδ.: 18.850



Μην μιμνηθείτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών εφαρμόστε το τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά από επηρεαζόμενα νερά (πηγάδια, λιμνοθάλασσες, ρυακια, ποταμούς). Επικίνδυνο στην περίπτωση που εφαρμόζεται όταν είναι παρόντα έντομα επικινδύνου όπως μέλισσες ή βελόνες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αγκυράνη (Y): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ανθών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-3 ανά 14 ημέρες.

Κεφαλαίος κράμβης (Y): Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελών. Για την καταπολέμηση των: Θρίπες, Μυρμηγκάκια. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλαίου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Ανθοκράμβης (Y): Μπρόκολο, Κουνουπίδι. Για την καταπολέμηση των: Θρίπες, Μυρμηγκάκια. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλαίου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκυθάκι (Y+Θ), Αγγουράκι (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Καλλιμαρική (Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.4-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση των πρώτων φυλλών – κατά την περίοδο όπου τα μανι αντιστοιχούν (Μάρτιος έως Οκτώβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Αρωματικό καλαμπόκι και βρώμη άνθη (Y): Βασιλικός, Ξέλλο, Ανθός, Εστραγκόν, Φασκόμηλο, Θυμαρί, Σχοινόραστο, Δελνιά, Δεντρολίβανο. Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση των πρώτων φυλλών μέχρι και πριν την άνθηση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Φάουλο (Y): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Δροσάφλλα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Φασόλι και αρακάς με λαβό, φρέσκο (Y): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.1-0.4 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι το πλήρες μέγεθος του λαβού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 7 ημέρες.

Φασόλι και αρακάς με λαβό, φρέσκο (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.1-0.4 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 7 ημέρες.

Μαρούλι και άλλες σαλάτες, Μαρούδι (Y), Αυκιτοβόλο (Y+Θ), Ρόκα (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι που η κεφαλή φάνηκε το επιθυμητό μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Γλυκό καλαμπόκι: Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Φυράλια. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.1-0.4 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι το στάδιο όπου είναι απαραίτητο στον σπόδα σποσών την ύδρευση. Το περιεχόμενο τους είναι φυτοτοξικό και η περικάλυψη τους σε ζεστά υψόμενα φάνηκε το 40%. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 21 ημέρες.

Πατάκι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του καρπού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Πιπερές (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των:

• Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Δορυφόρος, Τούτα. **Δόση:** 3 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα.

• Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα.

Όγκος ψεκ. υγρού: 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι και την ωρίμανση του καρπού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Πατάκι: Για την καταπολέμηση του Δορυφόρου. **Δόση:** 1.5 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 9 πρώτου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του κολοκύθου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Τομάτα (Y+Θ): Για την καταπολέμηση των:

• Πράσινο ακουκίλη, Σπυνοπίτερα, Τούτα. **Δόση:** 3 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα.

• Θρίπες. **Δόση:** 4 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα.

• Δορυφόρος. **Δόση:** 1.5 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα.

Όγκος ψεκ. υγρού: 0.2-1 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το τέταρτο φύλλο μέχρι και την ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 2 ανά 7 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζια και ονομαστικής ποιότητας): Για την καταπολέμηση των: Ευδεβλία, Κοχλίδα, Πυραλίδα, Δροσάφλλα. **Δόση:** 2 κ.κ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τερ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.15-0.6 λίτρο / 10 τερ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το δεύτερο φύλλο μέχρι το μαλάκωμα της ράγας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιοδομοθεσία:** 1-2 ανά 14 ημέρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΑΘΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):

Καλλιμαρική: Μη εφαρμοσμένο
(Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελών, Λινό (Μπρόκολο, Κουνουπίδι), Αγγούρι (Y+Θ), Αγγουράκι (Y+Θ), Κολοκυθάκι (Y+Θ), Βασιλικός, Ξέλλο, Ανθός, Εστραγκόν, Φασκόμηλο, Θυμαρί, Σχοινόραστο, Δελνιά, Δεντρολίβανο) (Y), Φυράλια (Y), Μαρούδι (Y), Αυκιτοβόλο (Y+Θ), Ρόκα (Y+Θ), Τομάτα (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Πιπερές (Y+Θ): 3
Αγκυράνη (Y), Φασόλι και αρακάς με λαβό, φρέσκο (Y+Θ), Πατάκι: 7
Αμπέλι (επιτραπέζια και ονομαστικής ποιότητας), Γλυκό καλαμπόκι: 14

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μέχρι να είναι πλήρως στεγνά με το ψεκαστικό υγρό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Συσκευασίες με ενσωματωμένο δοσομετρητή.

- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση.
- Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά.
- Για να ρίξετε την επιθυμητή δόση του σκευασμένου στο ψεκαστικό δοχείο χρησιμοποιήστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο που θα βρείτε ενσωματωμένο στη συσκευασία.
- Ξεβιδώστε το δοσομετρικό με λίγο νερό που θα το ρίξετε στο ψεκαστικό σας δοχείο και βάλτε το στη θέση του οφού βιδώσετε ξανά τη συσκευασία, για περαιτέρω χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Μην ψεκάζετε στα φύλλα.
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- Αποφύγετε να επινοήσετε βροχίτιση της συσκευασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανθοκομίας ή πρώτων καλλυπτικών ή φυτωρίων δέντρων, θάμνων και καλλυπτικών ζωοτροφών ζωοτροφών.
- Μην εφαρμόζετε σε στεγνά φυλλά.

Διαχειρίσιμη Ανθεκτικότητα:

- Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία spinosad, η οποία ανήκει στην ομάδα 5 κατά IRAC.
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:
 - Να εναλλάσσεται εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
 - Να ακολουθείται μέγιστος αριθμός εφαρμογών που αναφέρεται στην ετικέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το υλικό συσκευασίας δεν αποτελεί από πηγή ή για παράδειγμα έλξη (τα νερά του ελιψώματος ή ριχνόμενα στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια είναι κατασκευασμένα από υλικό που είναι ανθεκτικό στην υγρασία και στην υγρασία, η οποία διασφαλίζει την ανθεκτικότητα σε σημεία συλλογής για ανανέωση ή ανάκτηση εντομοκτόνου.